


معلومات آزمایش قند خون / لاکتوز وریدی

بیمار گرامی!

- < برای انجام آزمایش لاکتوز وریدی در لابرتوار ما، لطفاً موارد زیر را مدنظر داشته باشید:
- < برای جلوگیری از زمان انتظار، توصیه می‌کنیم که یک وقت ملاقات (آدرس‌های جراحان موردنظر شما در محل پذیرش ما) تعیین کنید.
- < در صورت داشتن مشکلات زبان آلمانی، لطفاً فردی را برای ترجمه به همراه خود بیاورید.
- < لطفاً قبل از آزمایش، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. اگر درخواست نمونه ادرار شده است – ظرف ادرار را قبل از معاینه طبی تحویل دهید.
- < اگر دیابت دارید و دارو مصرف می‌کنید، لطفاً قبل از معاینه به ما اطلاع دهید.
- < آزمایش قند خون / لاکتوز ۲ ساعت طول می‌کشد.
- < در طی معاینه، نباید لابرتوار را ترک کنید، در غیر اینصورت باید یک فرم بازگشت را امضا کنید. اگر لابرتوار را بدون اطلاع ترک کنید، آزمایش لغو می‌شود.
- < در طی معاینه، نباید بخورید و بیاشامید، به جز مقدار اندکی آب (تقریباً ۲۵۰ میلی‌لیتر).
- < می‌توانیم فقط از کودکان دارای حداقل ۴۵ کیلوگرم وزن، آزمایش بگیریم.
- < توالی آزمایش:

- سوزن‌زنی به انگشت فقط برای تعیین اینکه آیا آزمایش صورت گرفته است یا خیر، انجام می‌شود.
- پس از آن، اولین نمونه خون وریدی گرفته می‌شود.
- سپس، باید در طی ۵ دقیقه، یک محلول قند بخورید.



- زنان باردار: اندازه‌گیری وریدی پس از ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه.
- افراد غیرباردار: دومین اندازه‌گیری وریدی پس از ۱۲۰ دقیقه.
- آزمایش لاکتوز: اندازه‌گیری وریدی پس از ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه.

< توجه:

در صورت بروز تهوع و استفراغ در طی آزمایش، لطفاً بلافاصله به ما اطلاع دهید.