




## اطلاعات بیمار آزمایش قند خون / تحمل لاکتوز وریدی

بیمار عزیز!

- < برای انجام آزمایش قند خون/تحمل لاکتوز وریدی در آزمایشگاه ما، لطفاً به نکات ذیل توجه کنید:
- < به منظور پیشگیری از اتلاف وقت انتظار، توصیه می‌کنیم زمان ملاقات را تلفنی از قبل تعیین کنید (آدرس‌های مراکز جراحی مورد نظر شما در بخش پذیرش موجود است).
- < اگر برای ارتباط به زبان آلمانی مشکل دارید، لطفاً شخصی را برای ترجمه با خود بیاورید.
- < لطفاً هوشیار [بدون مستی] به اینجا مراجعه کنید. در صورتی که نمونه ادرار درخواست شد، ظرف ادرار را قبل از معاینه پزشکی تحویل دهید.
- < لطفاً در صورتی که دیابت دارید و دارو مصرف می‌کنید، قبل از معاینه به ما اطلاع دهید.
- < آزمایش قند خون/تحمل لاکتوز 2 ساعت طول می‌کشد.
- < در طول معاینه دو ساعته، نباید آزمایشگاه را ترک کنید در غیر اینصورت باید برگه پذیرش مسئولیت خروج را امضا کنید. اگر آزمایشگاه را بدون اطلاع ترک کنید، آزمایش لغو می‌شود.
- < در طول معاینه، نباید چیزی بخورید یا بنوشید، به جز آب، در جرعه‌های کوچک (تقریباً 250 میلی‌لیتر) و نیز به کودک نباید شیر داده شود.
- < ما تنها می‌توانیم از کودکان با حداقل وزن 45 کیلوگرم آزمایش بگیریم.
- < روند آزمایش تحمل لاکتوز:
- یک نمونه خون از نوک انگشت گرفته می‌شود تا تعیین شود آیا امکان انجام آزمایش تحمل لاکتوز وجود دارد یا خیر.



- پس از آن، اولین نمونه خون وریدی گرفته می‌شود.
- سپس باید یک محلول قندی را ظرف 5 دقیقه بنوشید.
- زنان باردار: سنجش وریدی پس از 60 و 120 دقیقه.
- افراد غیر باردار: سنجش وریدی پس از 120 دقیقه.
- آزمایش تحمل لاکتوز: سنجش وریدی پس از 30 و 60، 90 و 120 دقیقه.
- < توجه: لطفاً در صورت داشتن حالت تهوع و/یا استفراغ در حین آزمایش، فوراً به ما اطلاع دهید.