



## Troublemaker in der Kinderwunschbehandlung

Nach Studium der Online-Fortbildung beantworten Sie bitte die unten stehenden Multiple Choice Fragen. Eine Frage gilt dann als korrekt beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten markiert sind. Insgesamt müssen vier von sechs Fragen richtig beantwortet sein, damit zwei DFP-Fachpunkte anerkannt werden.

Bitte senden Sie diese Seiten per Fax oder Email an die Labors.at Fortbildungsakademie

Kürschnergasse 6B, 1210 Wien; Email: [DFP@labors.at](mailto:DFP@labors.at); Fax: 01/26053 5606

### FRAGEN:

#### Frage 1: Welche Aussagen zum luteo-plazentaren Shift treffen zu? (3 richtig)

- a) das vom Corpus luteum produzierte Progesteron wird ca. ab der 8. SSW von der Plazenta produziert
- b) die Progesteronproduktion wird unabhängig vom Corpus luteum von der Plazenta übernommen
- c) man kann davon ausgehen, dass nach dem luteo-plazentaren Shift Progesteron Substitution von außen nicht mehr nötig ist
- d) das vom Corpus luteum produzierte Progesteron wird ca. ab der 4. SSW von der Plazenta produziert

#### Frage 2: Welche Aussagen zum Progesteronwert treffen zu? (3 richtig)

- a) niedrige Progesteronwerte können einen Hinweis auf eine gestörte SS geben, die Lokalisation bleibt fraglich
- b) bei Pg > 25ng/ml kann eine extrauterine SS mit 97,5 % Sensitivität ausgeschlossen werden
- c) Pg < 5ng/ml sprechen mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine nicht vitale SS
- d) alle Progesteronwerte < 9ng/ml schließen eine vitale SS aus

#### Frage 3: In welchem Zeitabstand verdoppelt sich der HCG Wert bis zur ca. 9. SSW bei regelrechtem Schwangerschaftsverlauf? (1 richtig)

- a) alle 48 h
- b) alle 12 h
- c) alle 72 h
- d) alle 24 h

#### Frage 4: Nennen Sie die Indikationen einer MTX Therapie (2 richtig)

- a) kaum klinische Symptomatik
- b) Befunde < 35 mm
- c) EUG mit positiver Herzaktion
- d) HCG Werte > 5.000 IE

#### Frage 5: Was ist die Indikation für eine Androgenbestimmung? (2 richtig)

- a) Zyklusunregelmäßigkeiten und Androgenisierungserscheinung
- b) Androgenisierungserscheinungen
- c) Zyklusunregelmäßigkeiten
- d) immer bei Akne

#### Frage 6: Wann im Zyklus sollte eine Androgenbestimmung erfolgen? (1 richtig)

- a) egal wann
- b) prämenstruell
- c) postovulatorisch
- d) frühfollikulär in ovarieller Funktionsruhe

#### Frage 7: Welche der nachstehenden zählen zu den wichtigsten Differentialdiagnosen einer Hyperandrogenämie? (2 richtig)

- a) exogene Steroidzufuhr
- b) Hyperprolaktinämie
- c) androgenproduzierender Tumor
- d) M. Addison

#### Frage 8: Wozu dient ein ACTH Test? (1 richtig)

- a) zur Differentialdiagnostik bei NNR Tumor
- b) zur Ausschlussdiagnostik bei Hypercortisolismus
- c) zur Detektion adrenaler Enzymdefekte
- d) zur Funktionsprüfung der ovariellen Androgene

#### Frage 9: Welche der unten genannten sind vorgeschriebene infektiologische Screeningparameter laut GEEVO? (3 richtig)

- a) TPHA
- b) HIV 1 und 2
- c) Bakteriologischer Vaginalabstrich und PAP Test
- d) Chlamydien aus dem Harn

#### Frage 10: Welche sind die wichtigsten Kontaminationsquellen im Labor? (3 richtig)

- a) Luft
- b) Labormitarbeiter
- c) Patienten
- d) Embryonenkulturschrank

Name:	Adresse/Praxisstempel:
ÖAK Arztnummer:	
Datum:	
Unterschrift:	