

जानकारी

रक्त शर्करा/ शरिपरक लैक्टोज़ एक्सपोज़र परीक्षण


आदरणीय मरीजों!

हमारी प्रयोगशाला में रक्त शर्करा/ लैक्टोज़ एक्सपोज़र परीक्षण के लिए, कृपया नमिनलखिति को ध्यान में रखें:

- जाँच केवल पहले से समय लेकर ही कराई जा सकती है। परीक्षण का समय लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.labors.at में मेनू "Termin buchen" (समय बुक करें) पर जाएँ या 01/260 53-0 पर हमें कॉल करें।
- भाषा संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए कृपया अनुवाद के लिए किसी व्यक्ति को अपने साथ लाएँ।
- हम केवल न्यूनतम 45 कगिरा शारीरिक वजन से ऊपर वाले व्यक्तियों की ही जाँच कर सकते हैं।
- कृपया एक्सपोज़र परीक्षण के लिए आपको खाली पेट होना चाहिए, हालाँकि आप पानी या बिना चीनी की चाय पी सकते हैं।
- यदि पेशाब के सैपल के लिए कहा गया है - तो चिकित्सीय परीक्षण के पहले यूरिन बीकर सौंप दें।
- अगर आपको डायबटीज (मधुमेह या शुगर की बीमारी) है, आप रक्त में शुगर की मात्रा घटाने वाली दवाएँ लेते हैं, या इन्सुलिन थरेपी ले रहे हैं, या फरि आपके पेट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है या पेट का कुछ हिस्सा काट कर निकाला गया है (री-सेक्शन), तो यह जाँच करने की अनुमति नहीं है। इन मामलों में रक्त शर्करा एक्सपोज़र के लिए वैकल्पिक तौर पर एक बार रक्त लेकर नमिनलखिति जाँच की जाती है: फ़ास्टिंग ब्लड शुगर (BZ) और दीर्घकालिक शुगर (HbA1c)।
- रक्त शर्करा/ लैक्टोज़ एक्सपोज़र परीक्षण में 2.5 घंटे तक लग सकते हैं।
- जाँच के दौरान आपको प्रयोगशाला नहीं छोड़ना चाहिए अन्यथा आपको वापसी पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप घोषणा कएि बिना प्रयोगशाला से निकल जाते हैं तो परीक्षण रद्द हो जाएगा।
- जाँच के दौरान सविय पानी की छोटी घूंट के (अधिकतम 250 मिलीलीटर), आपको कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए।

एक्सपोज़र परीक्षण का क्रम:

- एक उंगली में सुई से छेद कर केवल यह निर्धारति करने के लिए कयिा जाता है कि एक्सपोज़र परीक्षण होना है या नहीं।
- उसके बाद पहला शरिपरक रक्त का नमूना लयिा जाता है।
- फरि आपको 5 मनिट के भीतर चीनी का घोल पीना होगा।
- गर्भवती महिलाएँ: शरिपरक माप 60 और 120 मनिट के बाद।
- गैर-गर्भवती महिलाएँ: द्वितीय शरिपरक माप 120 मनिट के बाद।
- लैक्टोज़ एक्सपोज़र परीक्षण: शरिपरक माप 30, 60, 90 और 120 मनिट के बाद।



नोट: कृपया परीक्षण अवधि के दौरान मतली और उल्टी होने पर हमें तुरंत सूचित करें।